HAUPT-
VERZEICHNIS

ÜBER

Sukkulenten
Mesembrianthemen
(Lebende Steinchen)

VON

RICHARD GRAESSNER
PERLEBERG
DEUTSCHLAND - GERMANY

The Special Pricelist is holding good for several years. In case of need supplements are printed.

The Special Pricelist of Cacti is a particular issue.

The list of seeds is printed in December of each year and will be forwarded on request.

Conditions of Sale.

Forwarding of plants against the amounts taken forward. Customers who want credit, are asked for references. Orders without stating the mode of payment, are effected against the amount in question being taken forward. To U.S.A. and Japan payment along with the order.

The prices are stated in Marks and Pfennigs, 1 RM. = $^{10}/_{42}$ U.S.A. $ and are meant per cash.

Place of payment is Perleberg.

All payments are to be sent franco Perleberg and it is not allowed to deduct postage and discount.

Court of justice for both parties is the „Amtsgericht" at Perleberg.

When forwarding amounts before the order being excuted, please add a sufficient sum for postage and packing.

The packing is made with utmost care and taking the season into consideration at the self cost price, but it is not taken back. Postal packages with plants to U.S.A. require a permit of the department of Agriculture at Washington.

All consignments are at consignees risk.

Please repeat the distinctly written address with each order.

Claims are to be raised immediately on receipt of the consignment.

This pricelist cancels all former pricelists.

The nursery and greenhouses can be visited.

Perleberg (Provinz Brandenburg) can be reached from Wittenberge (main road Berlin-Hamburg) in about 20 minutes.

Bank-account: Commerz- und Privatbank, Perleberg.

Telegram-address: Kakteenzüchter, Perleberg.

Telephone: Perleberg Nr. 353.

mbwDruck
Martin Böcker, Großdruckerei u. Verlagsanstalt, Wittenberge Bez. Pdm.

Die Gültigkeit des Hauptverzeichnisses erstreckt sich über mehr als ein Jahr. Bei Bedarf erscheinen Nachträge.

Das Hauptverzeichnis über Kakteen wird gesondert herausgegeben.

Die Samenliste erscheint im Dezember jeden Jahres und wird auf Wunsch zugesandt.

Verkaufsbedingungen.

Versand gegen Nachnahme. Auftraggeber, welche Kredit verlangen, werden um Angabe von Referenzen gebeten. Bestellungen ohne Angabe der Zahlungsweise werden durch Nachnahme erledigt.

Die Preise sind in Mark und Pfennig, 1 Mk. = 10/42 U.S.A.-Dollar, ausgedrückt und verstehen sich per Kasse.

Erfüllungsort für alle Zahlungen ist Perleberg.

Alle Zahlungen sind franko Perleberg zu richten, und es ist unstatthaft, Porto- und Skonto-Abzüge zu machen.

Gerichtsstand für beide Teile ist das Amtsgericht in Perleberg.

Bei vorheriger Einsendung des Betrages wolle man ausreichende Deckung für Porto und Verpackung der Bestellung beifügen.

Die Verpackung wird mit der größten Sorgfalt mit Rücksicht auf die Jahreszeit ausgeführt, zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Alle Sendungen gehen auf Gefahr des Empfängers.

Anschrift bitte auch bei jeder sich wiederholenden Bestellung recht deutlich anzugeben.

Reklamationen müssen sofort nach Empfang der Sendung angebracht werden.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Angebote ihre Gültigkeit.

Besichtigung der Kulturen außer an Sonn- und Feiertagen gern gestattet.

Perleberg (Prov. Brandenburg) ist von Wittenberge, D-Zug-Station an der Strecke Berlin-Hamburg, mit der Eisenbahn in 20 Minuten zu erreichen.

Postscheck-Konto: Berlin Nr. 9287.

Bank-Konten:

Perleberger Kreditbank, Städt. Sparkasse, Perleberg
Commerz- und Privatbank, Filiale Perleberg.

Telegramm-Anschrift: Kakteenzüchter Perleberg.

Fernruf 353.

Anacampseros tomentosa

Cotyledon Dinteri

Sukkulenten.

Die Preise richten sich nach der Größe und Seltenheit.
The prices are according to the size and rarity.
Synonyme Namen befinden sich in Klammern.
Synonyme names are in ( ).
Abbildungen in natürlicher Größe. Illustrations in natural size.

Benennung nach: Crassulaceae. Von A. Berger.
Nomination after: Sukkulente Euphorbien. Von A. Berger.
Stapelien und Kleinien. Von A. Berger.
Die Agaven. Von A. Berger.

Adromischus Lem.

clavifolius (Haw.) Lem. (Van der Heydenii Hort.) 2
Cooperi (Bak.) Brgr. . 3 — 6
cristatus (Haw.) Lem. . 2 — 5
maculatus (Salm) Lem. 4
Schaeferianus (Dtr.) Brgr. 2,50— 6

Aeonium W. et B.

(nicht winterharte Semperviven)

arboreum (L.) W. et B. 1 —10
„ var. atropurpureum Hort. 1 — 5
balsamiferum W. et B. 2
barbatum W. et B. . . 2
Burchardii Prgr. . . 2,50
caespitosum (C. Sm.) W. et B. 1 — 3
canariense (L.) W. et B. 2,50
Castello-Paivae Bolle . 1,50
chrysanthum (Hochst.) Brgr. (leucoblepharum Webb) 1 — 4
ciliatum (Willd.) W. et B. 2,50
decorum Webb . . . 1
domesticum (Pr.) Brgr. 1,50
„ fol. var. . 1,50
glutinosum (Ait.) Brgr. 1 — 8
gomerense Prgr. . . . 1,50
Goochiae W. et B. . . 2
Haworthii (Salm) W. et B. 1 — 5
hierrense (Murr.) Pit. et Prst. 2
holochrysum W. et B. . 1,50
lancerottense Prgr. . . 2,50
radicantissimum Hort. . 1 — 5
sedifolium (Webb) Pit. et Prst. 1
Smithii (Sims) W. et B. 2 — 6
spathulatum (Horn.) Prgr. (strepsicladum W. et B., Bentejui Webb.) 1,50
tabulaeforme (Haw.) W. et B. 1 — 5
tortuosum (Ait.) Brgr. (pygmaeum C. Sm., radicescens Lowe) 1 — 2
tortuosum fol. var. . . 1,50
urbicum (C.Sm.) W.etB. 2,50
viscatum Webb . . . 1,50

Agave L.

americana L.	2	—10
„ fol. var.	2	—20
atrovirens Karw.	3	—10
attenuata Salm	5	—20
Bergeri Trel.	1	
cantala Roxb. (Rumphii Jac.)	2	
chloracantha Salm	3	—10
densiflora Hook.	5	—25
Ferdinandi regis Brgr.	3	—10
filifera Salm	3	—10
fourcroydes Lem.	1,50	
Franzosinii Niss.	2	—10
Goeppertiana Jac.	10	
ingens Brgr. (picta)	2	
lophantha Schiede	1	— 5
macrantha Tod.	5	—25
micracantha Salm	2	— 3
mitis Salm (rupicola)	10	
polyacantha Jac.	3	— 8
Schottii Engelm.	1,50	
sisalana Perr.	2	
spectabilis	2	
Victoriae reginae T. Moore	3	—10

Aichryson W. et B.

dichotomum (DC.) W. et B. (annuum C. Sm.)	1	

Aloe L.

arborescens Mill.	1	—20
aristata Haw. (longiaristata R. et Sch.)	3	— 5
aurea	1	
ausensis Dtr.	3	
Beguinii Hort.	3	—20
Bortiana Terr. fil.	5	
brevifolia Mill.	3	—10
De Laetii Radl.	4	
eru Brgr.	1	
„ var. cornuta Brgr.	4	
„ „ glauca Hort.	4	
„ „ maculata Hort.	1	
ferox Mill.	1	
humilis Haw.	1	—10
latifolia Haw.	1	
longistyla Bak.	1,50	
Marlothii Brgr.	1,50	
Nowotnyi Radl.	3	—10
obscura Mill.	1	
„ var. intermedia	1	
Paxii Terr. fil.	1	
percrassa Tod.	1	
plicatilis Mill.	5	
pluridens Haw.	5	
Quehlii Radl.	3	— 5
runcinata Brgr.	1	
Salm-Dyckiana Schult. fil.	1	
„ var. fulgens (Tod.) Brgr.	4	
saponaria Haw. (umbellata Salm)	1	— 3
Schimperi Tod.	1	
smaragdina Hort.	8	
spinosissima Hort.	1	—10
Strausii Brgr.	5	
striata Haw. (Hanburyana Naud.)	1	— 5
supralaevis Haw.	1	
„ var. erythrocarpa Brgr.	1	
variegata L.	1	— 8
virens Haw.	1	
Winteri Brgr.	1	
Zeyheri Hort.	3	— 8

Anacampseros L.

albissima Marl.	2	— 5
arachnoides Sims	1,50	
crinita Dtr.	2,50	
Dielsiana Dtr.	2,50	
filamentosa Sims	1,50	
lanceolata DC.	1,50	
papyracea E. Mey.	4	— 8
quinaria E. Mey.	2	— 4
rufescens DC.	2,50	
telephiastrum DC.	2	
tomentosa Brgr.	1	— 3

Aprica Willd.

deltoidea Bak.	1,50	
pentagona Willd.	2	— 4
spiralis Haw.	2,50	

Arthrocnemum Moq.

glaucum Moq.	1,50	

Bryophyllum Salisb.

bracteosum	1	—10
crenatum Bak.	1	
pinnatum (Lam.) Kurz (calycinum Salisb.)	1,50	

Bulbine L.

aloides Willd.	2	
caulescens L.	1,50	
mesembrianthemoides L.	2,50	
rhopalophylla Dtr. . .	2,50	

Caralluma R. Br.

ausana Dtr. et Brgr. .	2	—10
Burchardii N. E. Br. .	2	— 4
europaea N. E. Br. . .	2	— 6
Leendertziae	3	— 5
Lugardii N. E. Br. . .	2,50	
lutea N. E. Br. . . .	2	— 4
Nebrownii Dtr. et Brgr.	2	—10
pseudonebrownii Dtr. .	2,50	
ramosa (Mass.) N. E. Br.	3	

Ceropegia L.

dichotoma Haw. . . .	3	
fusca Bolle	2,50	
Lushii Grah.	3	
radicans Schltr. . . .	5	
stapeliiformis Haw. . .	3	

Cotyledon L.

Barbeyi Schweinf. . .	1,50	
coruscans Haw. . . .	2	
decussata Sims . . .	2	
Dinteri Bak.	3	—10
Hoerleiniana Dtr. . . .	2,50	— 8
macrantha Brgr. . . .	2	— 6
orbiculata L.	1,50	
„ var. oophylla Dtr.	3	
papillaris Thunb. . . .	2	
ramosissima Haw. . .	1,50	
undulata Haw.	3	—10
ventricosa Lam. . . .	2	

Crassula L.

albiflora Sims (Rochea)	3	
Alstonii Marl.	2	
arborescens (Mill) Willd.	1	— 3
argentea Thunb. (portulacea Lam.)	2	—10
„ var. obtusifolia Brgr.	1	—10
canescens Roem. et Sch.	1,50	
cephalophora Thunbg. .	2	
columnaris Thunb. . .	3	— 5
congesta N. E. Br. . .	3	
Cooperi Rgl. (Bolusii Hk. fil.)	1	— 2
corallina Thunb. . . .	1	
cordata Thunb. . . .	2	— 3
corymbulosa Link . .	1	
cultrata L.	1	
deltoidea Thunb. . . .	3	
falcata Wendl. (Rochea)	1	— 3
fragilis Schönl. . . .	1	— 3
hemisphaerica Thunb. .	2,50	
heterotricha	1,50	
Hofmeyeriana Dtr. . .	2,50	
interrupta E. Mey. . .	2	— 6
Justus Corderoy . . .	2	
lactea Sol.	1	
liquiritiodora Dtr. . .	2	
lycopodioides Lam. .	1	
„ var. viridis Brgr.	1	
marginalis Sol. (centauroides Harv.)	1	
mesembrianthemopsis Dtr.	4	—10
multicavata Lem. . .	1	
nemorosa Endl. . . .	1,50	
odoratissima Dtr. . .	3	
orbicularis L.	1,50	
Peglerae Schönl. . .	1,50	
perfoliata L. (Rochea) .	2	—10
pseudocolumnaris Dtr. .	2,50	
pseudolycopodioides Dtr. et Schinz	1	— 3
pyramidalis Thunb. . .	3	
reversisetosa Bitt. . .	1	
rosularis Haw. . . .	2	— 3
rotundifolia Haw. (Rochea)	2	
rubicunda E. Mey. . .	1,50	
rupestris Thunb. (perfossa Lam., monticola N. E. Br.)	1,50	
sarmentosa Harv. . .	1	
Schmidtii Regel . . .	0,50	— 3
spathulata Thunb. . .	1,50	



Euphorbia avasmontana
½ natürliche Größe

Euphorbia Susannae

tabularis Dtr.	2
tecta Thunb.	3 — 5
tetragona L.	1 — 5
trachysantha (Eckl. et Zeyh.) Harv.	2

Cyanotis

kewensis Clarke	1,50
somaliensis Clarke	1,50

Dasylirion Zucc.

acrotrichum Zucc.	1,50
glaucophyllum Hook.	3
Wheeleri S. Wats.	1

(**Diotostemon** S.-D.) = **Pachyphytum** Lk., Kl. et Ot.

(**Dudleya** Br. et R.) = **Echeveria** DC.

Duvalia Haw.

glomerata Haw.	1,50— 3
hirtella Sweet	1,50— 3
„ var. obscura N. E. Br.	2 — 4
polita N. E. Br.	1,50— 5
pubescens N. E. Br.	2,50

Dyckia Schult. fil.

longifolia	1 — 5
rariflora Schult. fil.	3
sulphurea C. Koch	2,50— 5

Echeveria DC.

agavoides Lem.	1 —10
„ f. cristata	4
albocarinata Hort.	1 — 3
amoena L. de Sm. (pusilla Brgr.)	1
caespitosa DC. (Dudleya)	2,50
Derenbergii Purp.	1 — 5
edulis (Nutt.) Brgr. (Stylophyllum)	2 —10
elegans (Rose) Brgr. (Oliveranthus)	2 — 3
farinosa Lindl. (Dudleya)	2 — 4
Fischeri Hort.	2,50
gibbiflora DC.	1 — 3
„ var. carunculata Hort.	3 —10
„ „ metallica (Lem.) Bak.	1 — 3
gigantea Rose et Purp.	2 — 5
glauca Bak. (secunda glauca Hort.)	0,50— 4
„ f. cristata	3
gloriosa Rose	4
Grusonii Hort.	2,50
Haageana Hort. (agavoides x Derenbergii)	2,50
Hassei (Rose) Brgr. (Stylophyllum)	4
Howeyi Hort.	2,50
imbricata Hort.	1,50
Kircheriana Hort. (Derenbergii x carnicolor)	2,50
lanceolata Nutt.	2 —10
lancifolia	1 — 3
linguaefolia Lem.	3 — 5
longifolia Hort.	3
maculata Rose	3
magnifica Hort.	2
mucronata Schlechtd.	1,50— 4
multicaulis Rose	2
ovata Hort.	2,50
Peacockii Cr. (Desmetiana De Sm.)	1 — 3
perelegans Brgr. (elegans Rose)	1 — 5
pilosa Purp.	1 — 6
Pringlei Rose	1,50
pruinata Hort.	1 — 5
pruinosa Hort. (linguaefolia x coccinea)	1 — 3
pubescens Schlechtd.	1 — 3
pulchella Brgr.	1,50— 4
pulverulenta Nutt. (Dudleya)	3
pulvinata Rose	1,50— 4
Purpusorum Brgr. (Urbinia Purpusii Rose)	2 — 5
reflexa Br. (Dudleya)	2
retusa Lindl.	2

rosacea Lind. et And. .	3	
rubella Hort. (agavoides x cuspidata)	2	—10
scaphophylla Hort. . .	2	—10
Scheideckeri Hort. . .	1	— 3
secunda Booth . . .	1	
setosa Rose et Purp. .	1	— 3
subalpina Rose . . .	1	—10
Treleasii Rose (Dudleya)	3	
Weinbergii	1	— 3

Echidnopsis Hook. fil.

cereiformis Hook. fil. .	2	— 5
Dammanniana Sprgr. .	3	— 5

Euphorbia L.

aggregata Brgr. . . .	1	
alcicornis Bak. . . .	2	—20
Ammak Schwfth. . . .	4	—10
anacantha Ait. . . .	1	— 3
aphylla Brouss. . . .	1	
argillicola Dtr.	10	—20
atropurpurea Brouss. .	2	
avasmontana Dtr. . .	2	—10
balsamifera Ait. . . .	1,50	
Bojeri Hook.	2	— 5
bupleurifolia Jacq. . .	3	—10
canariensis L.	1	— 5
caput Gorgonis Brgr. .	3	—10
caput Medusae L. . .	2	—10
clandestina Jacq. . .	3	— 5
clava Jacq.	2,50	— 5
dendroides L.	0,75	
globosa Sims	1,50	—10
grandicornis Gbl. . .	4	—10
grandidens Haw. . . .	2	—20
Hermentiana Lem. . .	2,50	
heterophylla L. . . .	2,50	
inermis	3	—10
Ledienii Brgr.	2	
mammillaris L. . . .	1, 5	—15
„ var. spinosior Brgr.	2	
Marlothii Pax	4	—10
meloformis Ait. . . .	1	—10
„ var. Corderoy	2	—15
namibensis Dtr. . . .	15	—25
neriifolia L.	1	—10
neutra Brgr.	5	—10
obesa Hook. fil. . . .	6	—20
ornithopus Jacq. . . .	1,50	
parvimamma Boiss. . .	2	
polygona Haw. . . .	2,50	— 6
polycephala Marl. . . .	3	
pseudohypogaea Dtr. .	5	
Regis Jubae W. et B. .	1	
resinifera Berg . . .	1	
Schimperi Presl. . . .	1,50	
similis Brgr. (natalensis Hort.)	4	—20
splendens Bojer . . .	2	—10
Tirucalli L.	1,50	
stellata Willd.	3	— 6
Susannae Marl. . . .	5	—20
triangularis Desf. . . .	1	— 4
virosa Willd.	2	

winterhart

capitulata	1	
myrsinites	1	
polychroma	1	

Furcraea Vent.

Bedinghausii C. Koch .	3	— 5
elegans Tod.	3	— 5
Lindenii	5	
pubescens Tod. . . .	3	— 5

Gasteria Duv.

acinacifolia Haw. . . .	1,50	
Croucheri Bak. . . .	2,50	— 6
disticha Haw.	1,50	
excavata Haw.	3	
gigantea	3	
guttata	1	
intermedia Haw. . . .	1,50	
latifolia	2,50	
maculata Haw. . . .	1	— 3
minima	2	
mollis Haw.	2,50	— 5
multipunctata	1,50	
nitida Haw.	3	
scaberrima	3	
spiralis Bak.	2	
subrigida	1	
subverrucosa Haw. .	2	— 5
verrucosa Haw. . . .	1	— 5

Greenovia W. et. B.

aurea (C. Sm.) W. et B.
dodrentalis (Willd.) W. et B.

Crassula tecta

Sarcocaulon rigidum
⅔ natürliche Größe

Haworthia Duv.

altilinea Haw. . . .	2,50	
arachnoides Haw. . .	4	
aspera Haw.	4	
atrovirens Haw. . . .	2,50	
Chalwinii Marl. et Brgr.	4	
coarctata Haw. . . .	2,50	
cuspidata Haw. . . .	5	
cymbifolia	1	— 3
cymbiformis Haw. . .	1	— 5
„ var. obtusa Bak.	2	
denticulata Haw. . . .	3	
Greeni Bak.	2	— 5
Krauseri	2	— 4
margaritifera Haw. . .	2	— 5
Peacockii Bak. . . .	5	
planifolia Haw. . . .	2,50	
pseudorigida	3	
radula Haw.	2	
retusa Haw.	3	
rugosa Bak.	1	— 5
setata Haw.	3	
subrigida Bak. . . .	2	— 4
„ var. attenuata .	2,50	
tesselata Haw. . . .	2	— 4
„ var. parva Bak.	2,50	
tortuosa Haw. . . .	2,50	
„ var. tortella Bak.	4	
turgida Haw.	3	
verrucosa	2	
virescens Haw. . . .	2,50	
viscosa Haw.	2,50	
„ var. torquata Bak.	3	

Heurnia R. Br.

barbata Haw. . . .	2	— 4
Blackbeardae R. A. Dyer.	2	— 6
brevirostris N. E. Br. .	2	— 5
„ var. intermedia N. E. Br.	2	— 5
hystrix N. E. Br. . . .	3	
longituba N. E. Br. . .	1,50	
Penzigii N. E. Br. . .	3	
Pillansii N. E. Br. . .	2	— 5
primulina N. E. Br. . .	2	— 5
„ var. rugosa N. E. Br.	2	— 4
Schneideriana Brgr. .	2	— 8
Thuretii Cels.	2	— 4
zebrina N. E. Br. . .	1,50	

Heurniopsis N. E. Br.

decipiens N. E. Br. . .	2	— 5

Hoodia Sweet

Gordonii Sweet . . .	3	— 5
macrantha Dtr. . . .	3	— 5

Hoya L.

carnosa R. Br. . . .	1	— 3

Kalanchoe Adans.

crenata Haw.	1.50	
Ena	2,50	
Engleri	1,50	
felthamensis Hort. . .	1,50	
flammea Stapf. . . .	1,50	
glaucescens Britt. . .	2	
grandiflora Wight et Arn.	1	— 3
kewensis Hort. . . .	3	—10
Lübbertiana	1,50	
marmorata Bak. . . .	2,50	
Petitiana	2	— 4
rotundifolia Haw. . . .	2,50	
Schimperiana A. Rich. .	2,50	
thyrsiflora Harv. . . .	1,50	

Kleinia L.

acaulis DC.	2	
adenocalyx Dtr. . . .	2	
amaniensis Brgr. . .	1,50	— 3
antheuphorbium DC. . .	2	
articulata Haw. . . .	1	— 3
cuneifolia DC.	3	
cylindrica Brgr. . . .	1	— 4
ficoides Haw.	1	— 3
Grantii Hook. fil. . . .	2	
Herreiana Dtr. . . .	3	
neriifolia Haw. . . .	2,50	
odora DC.	1,50	
pendula DC.	1,50	— 4
radicans Haw.	1,50	
repens Haw.	1	— 4
subscandens	1,50	
tomentosa Haw. (canescens Willd.)	2	— 4

Lenophyllum Rose

guttatum Rose . . . 2,50

Monanthes Haw.

anagensis Prgr. . . . 1,50
angulensis Hort. . . . 1,50
brachycaulon x laxiflora Prgr. 1,50
laxiflora (DC.) Bolle (agriostaphis W. et B.) 1,50
„ var. eglandulosa Bornm. 1,50
„ x pallens Prgr. 1,50
muralis (Webb) Chr. . 1,50
polyphylla Haw. . . . 2

(Oliveranthus) = Echeveria

Orostachys Fisch.

spinosus Brgr. (Umbilicus spinosus DC.) 1 — 2

Othonna L.

clavifolia Marl. . . . 4
crassifolia Harv. . . . 1
pusilla Dtr. 2

Pachyphytum Lk., Kl. et Otto

amethystinum Rose . . 3
bracteosum Lk., Kl. et Otto 1 —10
„ f. cristata . . 3
brevifolium Rose . . . 3
compactum Rose . . . 2
Hookeri (Salm) Brgr. . 2,50
oviferum Purp. . . . 4
uniflorum Rose . . . 3

Pachypodium Lindl.

Saundersii 1,50

Pachyveria Hort.

glauca Hge. et Schm. . 2 — 4

Pelargonium L'Hérit.

amabile Dtr. 2,50
crassicaule L'Hérit. . 2 —15
echinatum Curt. . . . 2

(Petrophyes) = Monanthes.

Piaranthus R. Br.

foetidus N. E. Br. . . 2,50

Portulacaria Jacq.

afra Jacq. 1

Rochea DC.

coccinea (L.) DC. . . 1 — 3
(falcata, perfoliata, rotundifolia s. unter Crassula)

Rosularia (DC.) Stapf

pallida (Schott et Kotsch.) Stapf. (Umbilicus chrysanthus Boiss.) 1 — 2
sempervivum (M. Bieb.) Brgr. (Umbilicus, Sedum sempervivum) 1,50

Sarcocaulon DC.

rigidum Schinz . . . 3 —10

Sarcophagophilus Dtr.

Winklerianus Dtr. . . 5

Sarcostemma R. Br.

australis R. Br. . . . 2

Sedum L.

(Für Kalthaus und Zimmer)

allantoides Rose . . . 1,50
Adolphi Ham. . . . . 1 — 3
amecamecanum Prgr. . 1



Haworthia margaritifera
½ natürliche Größe



Heurnia Penzigii

Pelargonium crassicaule
½ natürliche Größe



Heurnia Pillansii

aoikon Ulbr. 1,50
bellum Rose (farinosum Rose) 1
Bourgaei Hemsl. . . 1
cupressoides Hemsl. . 2 — 4
dendroideum Moc. et Sessé 1 —10
„ f. cristata . . 2
diversifolium Rose . . 1
Eichlamii 2,50
humifusum Rose . . . 1
lineare Thunb. (carneum) 1
„ fol. var. Prgr. 1
mexicanum Britt. . . 1
moranense H. B. K. . 1
multiceps Coss. et Dur. 1
Nußbaumerianum Bitt. . 1 — 3
oaxacanum Rose . . . 1
oxypetalum H. B. K. . 1
pachyphyllum Rose . 1 — 4
Palmeri W. Wats. . . 1
retusum Hemsl. . . . 1
Stahlii Solms 1
thelephiastrum . . . 1
Treleasii Rose . . . 1 — 3
villosum L. 1
Weinbergii Rose (Echeveria arizonica Hort.) 1 — 3

Sedum L. (winterhart)

acre L. 0,30
„ var. sexangulare (L.) Koch 0,30
„ „ Wettsteinii (Fr.) Hegi 0,75
acutifolium Ledeb. . . 0,40
aizoon L. 0,50
„ var. minus . . . 0,50
Albertii Rgl. 0,40
album L. 0,30
„ var. murale Prgr. 0,40
„ „ micranthum chloroticum Rouy et Cam. 0,50
annuum L. 0,30
anacampseros L. . . 0,50
anglicum Huds. . . . 0,40
„ var. minus Prgr. 0,40
anopetalum DC. (ochroleucum Chaix) 0,40
asiaticum 0,50
atrosanguineum Hort. . 0,50
Borderi Rouy et Cam. 0,75
Braunii 0,40
calabricum 0,40
collinum 0,40
corsicum 0,40
cruentum 0,40
cyaneum Rud. 0,40
dasyphyllum L.
„ var. glanduliferum Mor. (corsicum Duby) 0,40
„ var. Sündermannii Prgr. 0,50
Douglasii Hook. . . . 1
Ellacombianum Prgr. . 0,50
elongatum Wall. . . 0,40
Ewersii Led. 0,40
„ var. turkestanicum Hort. 0,40
fabaria (Koch) Schz. et Kell. 0,50
Forsterianum Smith . . 0,50
gracile C. A. Meyer . 0,50
gypsicolum Boiss. et Reut 0,40
Hartmannii 0,40
Hayesii 0,50
hispanicum L. (glaucum Waldst. et Kit.) 0,40
„ var. minus Prgr. (lydium glaucum) 0,40
„ var. aureum (lydium aureum) 0,40
hybridum L. 0,40
Jaccardianum Maire et Wilcz. 1
kamtschaticum Fisch. et Mey. 0,40
„ fol. var. . . 0,50
laconicum Boiss. et Heldr. 0,40
Laggeri Hort. 0,40
Lehmannii Hort. . . . 0,40
lydium Boiss. 0,40
magellense Ten. (olympicum Boiss.) 0,40
Maximowiczii Regel . 0,40
maximum Sut. . . . 0,50
Middendorfianum Maxim. 0,40
„ var. diffusum Prgr. 0,40

Nevii Gray var. Beyrichianum (Mast.) Prgr.	0,40
obtusifolium C. A. Meyer	0,40
populifolium Pall. . . .	0,40
pruinatum Brot.	0,40
pulchellum Michx. . . .	0,50
purpureum (Lk.) Schz. et Kell. (purpurascens Koch)	0,50
rupestre L. (elegans Lej.)	0,40
reflexum L.	0,40
„ var. cristatum Prgr.	0,40
„ „ virescens .	0,40
roseum (L.) Scop. (Rhodiola DC.)	0,75
sarmentosum Bunge .	0,40
sediforme (Jacq.) C. Pau (altissimum Poir., nicaeense All.)	0,40
Sieboldii Sw.	0,50
„ fol. var. . . .	0,75
spathulifolium Hook. .	0,50
„ var. purpureum Prgr.	0,50
spectabile Bor. . . .	0,50
spurium M. Bieb. . .	0,40
„ var. album . .	0,40
„ „ caucasicum .	0,40
„ „ atropurpureum	0,40
„ „ ibericum .	0,40
„ „ portulacoides	0,40
„ „ splendens Hort.	0,40
Stribrnyi Vel. . . .	0,75
telephium L.	0,50

Sempervivum L.

(winterhart)

acuminatum Bak. . .	0,50
admontense	0,50
affine Lam.	0,40
albidum Lehm. et Schnittsp.	0,40
alpinum (Gris. et Schk.) Wettst.	0,50
angustifolium Bak. . .	0,40
anomalum Bak. . . .	0,40
arachnoideum L. . . .	0,40
„ var. minus .	0,40
arenarium Koch . . .	0,40
arvernense Lec. et Lam.	0,40
atlanticum (Ball) Hook.	0,75
atropurpureum Hort. .	0,75
atroviolaceum Hort. .	0,40
barbulatum Schott . .	0,50
Boissieri Boiss. . . .	0,40
Boutignyanum Schulz et Bord.	0,40
Braunii Fck.	0,40
Burnatii Wettst. . . .	0,75
calcareum Jord. . . .	0,40
cinerascens	0,75
Comolii Rota	0,40
coperticum	0,40
cornutum Hort. . . .	0,40
debile Schott	0,40
Doellianum Schnittsp. et Lehm.	0,40
elegans Lagg.	0,40
erythraeum Vel. . . .	0,80
fimbriatum Lehm. et Schnittsp.	0,40
flagelliforme Lehm. et Schnittsp.	
flavipilum Hausm. . .	0,50
Funckii F. Braun . .	0,40
glaucum Ten.	0,40
globiferum L.	0,40
grandiflorum Haw. . .	0,40
Hausmannii Auersd. .	0,40
Heerianum Bruegg. .	0,50
heterotrichum Schott. .	0,40
hirtum L.	0,40
hispidulum	0,50
hybridum Alpha . . .	0,75
„ Beta . . .	0,75
„ Gamma . .	0,75
Laggeri Schott . . .	0,40
„ var. virescens .	0,40
Lehmannii Hort. . . .	0,40
Mettenianum Schnittsp. et Lehm.	0,40
modestum Jord. et Fourr.	0,40
Moggridgei Hook. fil. .	0,40
montanum L.	0,40
Neilreichii Schott. . .	0,40
patens Gris. et Schk. .	0,50
parviflorum	0,40

piliferum Jord. . . . 0,40
Pittonii Schott . . . 0,40
purpureum 0,40
Reginae Amaliae Heldr. 1
robustum Jord. et Fourr. 0,40
roseum Hut. 0,40
rubicundum Schur. . . 0,40
rupestre Ruy et Cam. . 0,40
rupicolum Kern. (Huteri Hausm., Theobaldi Brggr.) 0,40
ruthenicum Koch . . . 0,75
Scherzerianum . . . 0,40
Schlehanii Schott (assimile Schott) 0,40
Schnittspahnii Lagg. . 0,40
Schottii (Bak.) Wettst. . 0,40
soboliferum Sims . . 0,40
stririacum Wettst. . . 0,40
Tatari 0,40
tectorum L. 0,40
„ var. bicolor . . 0,40
„ „ pyrenaicum 0,40
tometosum Schnittsp. et Lehm. 0,40
triste Bak. 0,40
violaceum A. Braun . 0,40
Webbianum Schnittsp. et Lehm. 0,50
Widderi Schnittsp. et Lehm. 0,75
Wulfenii Hoppe . . . 0,40
Zelebori Schott. . . . 0,75

Senecio L.

longifolius L. 1,50
oxyriaefolius DC. . . 1,50
paucifolius Dec. . . . 1,50
tropaeolifolius M. Ow. . 1,50
usambarensis . . . . 1 — 3
scaposus DC. . . . . 2 — 4

Sinocrassulla Brgr.

yunnanensis (Fr.) Brgr. (Sedum indicum var. yunnanense Ham.) 1,50

Stapelia L.

albicans Sprgr. . . . 1,50
bella Brgr. 2,50
charybdis Rüst . . . 1,50
Cooperi N. E. Br. . . . 1,50
Dinteri Brgr. 2,50
discolor Tod. 1,50
Fleckii Brgr. et Schtr. . 2 — 5
gemmiflora Mass. . . 2
grandiflora Mass. . . . 2 — 5
hirsuta L. 2
hispida Hort. 1,50
Juttae Dtr. 2,50
kwebensis N. E. Br. . . 2
Leendertziae 2,50
muricata Rüst 1,50
nobilis N. E. Br. . . . 2 —10
olivacea N. E. Br. 2,50
pachyrrhiza Dtr. . . . 4
parvipunctata Rüst . . 1,50— 3
pulvinata Mass. . . . 2 — 6
revoluta Hort. 2
rugosa Rüst 1,50
Schinzii Brgr. et Schltr. 1 — 3
tigrina Rüst 1,50
tsomensis N. E. Br. . . 2
Uspenskyi Rüst . . . 1,50
variegata L. 1,50
„ var. atrata (Tod.) N. E. Br.
„ „ bufonia (Donn.) N. E. Br. 1,50
„ „ conspurcata (Willd.)N.E.Br. 1,50
„ „ marmorata (Jacq.) N.E.Br. 1,50
„ „ normalis Jacq. 1,50
„ „ picta (Donn.) N. E. Br. (anguinea Jacq.) 1,50
„ „ planiflora (Jacq.) N.E.Br. 1,50
verrucosa Mass. . . . 1,50
„ var. pulchra N. E. Br. 1,50

(Stylophyllum) = Echeveria

Tavaresia Welw.

grandiflora Dtr. et Brgr 1,50

Tradescantia L.

navicularis Ortg. . . 1 — 2

Trichocaulon N. E. Br.

piliferum N. E. Br. . . 5 —10

(Urbinia) = Echeveria

Yucca L.

elata Engelm. 1
filamentosa L. . . . 2,50
gloriosa L. 1,50

Umbilicus s. unter Rosularia und Orostachys



Astridia velutina
½ natürliche Größe



Conophytum Wettsteinii

Mesembrianthemen.

Gattungsbezeichnung nach der Einteilung von Professor N. E. Brown und Professor Dr. Schwantes.

Unter dem Gattungsnamen Mesembrianthemum ist der größere Teil der Arten in dem Buch: Mesembrianthemen und Portulaceen, von A. Berger beschrieben.

Names of genus after the method of Professor N. E. Brown and Professor Dr. Schwantes.

Under the generic name Mesembrianthemum the larger part of kinds is described in the book: Mesembrianthemen, by A. Berger.

Argyroderma N. E. Br.

roseum (Haw.) Schwant. (De Laetii Maass) 3
testiculare (Ait.) N. E. Br. 2 — 4

Aptenia Schwant.

cordifolia (L.) Schwant. 1

Argeta N. E. Br.

petrensis N. E. Br. . . 5

Aridaria Schwant.

noctiflora (L.) Schwant. 1,50
„ var. fulva (Salm) Schwant. 1,50
splendens (L.) Schwant. 1 — 5

Astridia Dtr. et Schwant.

maxima (Haw.) Schwant. 2,50
velutina Dtr. . . . . 3 — 5

Bergeranthus Schwant.

multiceps (Salm) Schwant. 2 — 5
scapiger (Haw.) N. E. Br. 2 —10
vespertinus (Brgr.) Schwant. 2 —10

Carpobrotus N. E. Br.

edulis (L.) N. E. Br. . 1

Carruanthus Schwant.

caninus (Haw.) Schwant. 4 —10

Cephalophyllum N.E.Br.

confusum Dtr. et Schwant. 2 — 5
diversifolium (Haw.) Schwant. 2 — 5
ebracteatum (Schltr. et Diels) Dtr. et Schwant. 2
macrocarpum Dtr. . . 3 — 4

Cheiridopsis Caroli-Schmidtii



Cheiridopsis insignis



Dinteranthus Margaretae



Juttadinteria Simpsonii



Dinteranthus microspermus



Didymaotus lapidiformis

Chasmatophyllum

Dtr. et Schwant.

musculinum (Haw.) Dtr. et Schwant.	2	— 5

Cheiridopsis N. E. Br.

bifida (Haw.) N. E. Br. (multipunctata S.-D.)	3	— 8
Caroli-Schmidtii (Dtr. et Brgr.) N. E. Br.	3	—15
Derenbergiana Schwant.	6	
insignis Schwant. (Graessneri Schick et Tisch.)	4	—10
inspersa N. E. Br. . .	5	
Meyeri N. E. Br. . . .	4	—12
peculiaris N. E. Br. .	5	
puberula Dtr.	4	— 8
rostrata (L.) N. E. Br. .	4	—10
Schickiana Tisch. . .	3	—10
Schinziana Dtr. . . .	5	—10
tuberculata (Mill.) N. E. Br.	4	— 8
verrucosa L. Bol. (mirabilis Schwant.)	3	—10

Conicosia Schwant.

brevicaulis (Haw.) Schwant.	2,50	

Conophytum N. E. Br.

altile N. E. Br.	4	— 8
albescens N. E. Br. . .	3	— 8
assimile N. E. Br. . .	4	— 8
calculus (Brgr.) N. E. Br.	3	— 6
cordatum Schick et Tisch.	3	— 6
corniferum Schick et Tisch	3	— 8
cylindratum Schwant. .	3	— 8
Elisbae N. E. Br. . .	5	—10
Ernianum Loesch et Tisch.	4	— 6
ficiforme (Haw.) N. E. Br.	3	—10
flavum N. E. Br. . . .	4	—10
globuliforme Schick et Tisch.	3	— 8
gracilistylum N. E. Br. .	3	—10
gratum N. E. Br. . .	5	
halenbergense Dtr. et Schwant.	2	—20
hians N. E. Br. (elongatum Schick. et Tisch.)	2	—10
Johannis Winkleri (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.	5	—10
kovismontanum Dtr. . .	5	—10
labyrintheum N. E. Br.	4	— 6
leviculum N. E. Br. . .	3	—10
Loeschianum Tisch. . .	3	— 8
Markoetterae Schwant.	4	—10
Marlothii N. E. Br. . .	3	—10
Meyeri N. E. Br. . .	2	—20
minutiflorum (Schwant.) N. E. Br.	3	—10
minutum (Haw.) N. E. Br.	4	—10
misellum N. E. Br. . .	2	—15
Nevillei N. E. Br. . . .	4	—10
obcordellum (Haw.) N. E. Br. (obconellum Haw.)	2	— 8
obmetale N. E. Br. . .	4	— 6
obscurum N. E. Br. . .	4	—10
Pageae N. E. Br. . . .	3	— 8
pallidum N. E. Br. . .	4	
pauxillum N. E. Br. . .	3	—10
piluliforme N. E. Br. . .	5	
placitum N. E. Br. . .	2	—20
Poellnitzianum Schwant.	3	— 8
praeparvum N. E. Br. .	3	—10
Purpusii (Schwant.) N. E. Br.	5	—10
pusillum N. E. Br. . .	3	—10
quaesitum N. E. Br. . .	3	—10
saxetanum N. E. Br. .	2	—20
Schickianum Tisch. . .	4	— 8
Schlechteri Schwant. .	2	— 8
scitulum N. E. Br. . .	2	—10
sellatum Tisch. . . .	3	— 6
signatum N. E. Br. . .	3	— 8
Tischeri Schick . . .	3	— 6
tabulare Loesch et Tisch.	10	
truncatellum (Haw.) N. E. Br.	3	— 5

violaciflorum Schick et Tisch. 3 —10
viridicatum N. E. Br. . 3 —10
Wettsteinii (Brgr.) N. E. Br. 3 —10
velutinum Schwant. . 4

Conophyllum Schwant.

clivorum (N. E. Br.) Schwant. 4

Corpuscularia Schwant.

Lehmannii (Eckl. et Zeyh.) Schwant. 1 — 5
Taylorii (N. E. Br.) Schwant. 1,50

Cylindrophyllum Schwant.

calamiforme (L.) Schwant. 3 —20

Delosperma Schwant.

Brunnthalerii (Brgr.) Schwant. 1 — 3
echinatum (Ait.) Schwant. fl. albo 1 — 3
„ fl. luteo . . . 1 — 3
Ecklonis (Salm) Schwant. 1,50
Klinghardtianum Dtr. et Schwant. 2
Mahonii (N. E. Br.) Schwant. 2
subincanum (Haw.) Schwant. 2

Didymaotus N. E. Br.

lapidiformis (Marl.) N. E. Br. 3 —10

Dinteranthus Schwant.

Margaretae Schwant. . 2,50
microspermus (Dtr. et Dbg.) Schwant. 5

Disphyma N. E. Br.

crassifolia (L.) N. E. Br. 1,50
crassulina (DC.) N.E.Br. 1

Dracophilus Schwant.

De Laetianus Dtr. et Schwant. 3 —10
rheolens L. Bol. (semilunoides Tisch.) 3

Drosanthemum Schwant.

candens (Haw.) Schwant. 1 — 3
hispidum (L.) Schwant. 1 — 2
floribundum (Haw.) Schwant. 1 — 3
Luederitzii (Engl.) Schwant. 1 — 3
pauper Dtr. et Schwant. 1,50— 5
Paxianum (Schltr. et Diels) Schwant. 1,50
pruinosum (Thunbg.) Schwant. 1,50

Eberlanzia Schwant.

sedoides (Dtr. et Brgr.) Schwant. 3
hospitalis (Dtr.) Schwant. 2
spinosa (L.) Schwant. . 2,50

Ebracteola Dtr. et Schwant.

Derenbergiana Dtr. et Schwant. 2 —10
montis Moltkei Dtr. et Schwant. 1 —10
vallis pacis Dtr. . . . 2 — 5

Erepsia N. E. Br.

heteropetala (Haw.) Schwant. 1,50
inclaudens (Haw.) N. E. Br. 2



Dracophilus De Laetianus

Ebracteola montis Moltkei



Gibbaeum dispar



Gibbaeum Nelii



Rimaria Heathii

Faucaria Schwant.

Bosscheana (Brgr.) Schwant. 2,50— 8
felina (Haw.) Schwant. . 2,50
lupina (Haw.) Schwant. 2 — 6
tigrina (Haw.) Schwant. 1,50—10
tuberculosa (Rolfe) Schwant. 3 — 8

Fenestraria N. E. Br.

aurantiaca N. E. Br. . 2,50— 5
rhopalophylla (Schltr. et Diels) N. E. Br. 2,50— 4

Gibbaeum N. E. Br.

album N. E. Br. . . . 2,50, 5
Shandii N. E. Br. . . . 5
dispar N. E. Br. . . . 5
geminum N. E. Br. . . 4 — 8
molle N. E. Br. . . . 3 —10
Nelii Schwant. . . . . 3 —20
pilosulum N. E. Br. . . 5
pubescens (Haw.) N. E. Br. 4 — 8
velutinum (L. Bol.) Schwant. 4

Glottiphyllum Haw.

arrectum N. E. Br. . . 3
angustum (Haw.) N. E. Br. 1,50
latum (Haw.) N. E. Br. (obliquum Willd.) 1,50
„ var. cultratum (Salm) N. E. Br. 1,50
longum (Haw.) N. E. Br. 1,50
„ var. hamatum N. E. Br. 1,50
linguiforme (L.) N. E. Br. 1,50— 3
Marlothii Schwant. . . 1,50
uncatum (S.-D.) N. E. Br. 1,50

Hereroa Dtr. et Schwant.

hesperantha (Dtr. et Brgr.) Dtr. et Schwant. 2 —10
Puttkameriana (Dtr. et Brgr.) Dtr. et Schwant. 2 — 6
„ var. glabrior Dtr. 2,50— 4

Hymenocyclus Dtr. et Schwant.

Englerianus (Dtr. et Brgr.) Dtr. et Schwant. 2
ochraceus (Brgr.) L. Bol. 2

Juttadinteria Schwant.

buchubergensis Dtr. . 3 — 5
cinerea (Marl.) Schwant. 3 —10
decumbens Schick et Tisch. 3 — 8
deserticola (Marl.) Schwant. 3 —10
kovismontana (Dtr.) Schwant. 3
ponderosa Dtr. . . . 2,50
Simpsonii (Dtr.) Schwant. 3 —10
suavissima Schwant. . 3

Lithops N. E. Br.

alpina Dtr. . . . . . 3 — 5
bella N. E. Br. . . . 2 —10
Eberlanzii Dtr. et Schwant. 3 —10
Francisci Dtr. et Schwant. 3 —15
fulviceps N. E. Br. . . 3 —10
Julii Dtr. et Schwant. . 3
karasmontana (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. 3 — 6
kuibisensis Dtr. . . . 3 —10
kunjasensis Dtr. . . . 3
Lesliei N. E. Br. . . 1 —10
mickbergensis Dtr. . 3 — 6
opalina Dtr. 3
optica (Marl.) N. E. Br. 3 —10

Pleiospilos Roodiae

Psammophora longifolia

pseudotruncatella (Brgr.) N. E. Br.	1	—5
„ var. Mundtii Tisch.	1	—10
„ „ pulmonuncula Dtr. von Friedental	3	—8
„ „ pulmonuncula Dtr. von Gründorn	3	—8
rugosa Dtr.	3	—5
Schwantesii Dtr. . .	3	—8
summitatum Dtr. . . .	3	
terricolor N. E. Br. . .	3	
Hookeri (Brgr.) Schwant. (turbiniformis N. E. Br.)	3	—6
urikosensis Dtr. . . .	3	—5
fl. albis Dtr. nordw. von Mickberg	3	

Mesembrianthemum L.

amoenum Salm . . .	1	
aureum L.	1	
auratum Sond. . . .	1	
australe Sol.	1,50	
Brownii Hook. . . .	1,50	
clavellatum Haw. . .	1,50	
coccineum Haw. . . .	1	
conspicuum Haw. . .	1	
Cooperi Hook. . . .	1,50	
elegans Jacq.	1	
falciforme Haw. . . .	1,50	
glomeratum L. . . .	1,50	
Haworthii Don. . . .	1,50	
Hoerleinianum Dtr. . .	1,50	
inconspicuum Haw. .	1,50	
incurvum Haw. . . .	1,50	
lunatum Willd. . . .	1	—5
productum Haw. . . .	1	
roseum Willd. . . .	1	—3
serrulatum Haw. . .	2	
spectabile Haw. . . .	1	—3
Stephanii Schwant. . .	1,50	
turbinatum Jacq. (blandum Haw.)	1	
„ var. curviflorum (Haw.) Brgr.	1	
„ „ roseum .	1	
verruculatum Thunbg. .	1,50	
Zeyheri Salm	1	—4

Mitrophyllum Schwant.

mitratum (Marl.) Schwant.	4	—15
grande N. E. Br. . .	5	—10

Muiria N. E. Br.

Hortenseae N. E. Br. .	4	—10

Nananthus Schwant.

albinotus (Haw.) Schwant.	3	
aloides (Haw.) Schwant.	3	—8
vittatus (N. E. Br.) Schwant.	2,50	

Nelia Schwant.

Schlechteri Schwant. .	3	

Ophthalmophyllum Dtr. et Schwant.

Friedrichiae Dtr. et Schwant.	4	—8

Oscularia Schwant.

caulescens (Mill.) N. E. Br.	1	
deltoides (Mill.) Schwant.	1	—3
muricata (Haw.) Schwant.	1	

Platythyra N. E. Br.

Haeckeliana (Brgr.) N. E. Br.	2	

Pleiospilos N. E. Br.

(**Punctillaria** N. E. Br.)

Bolusii (Hook. fil.) N. E. Br.	2	—6
magnipunctatus (Haw.) Schwant.	3	—10



Ophthalmophyllum Friedrichiae

Lithops alpina

Lithops bella



Lithops fulviceps



Lithops Dinteri

Lithops Eberlanzii

Lithops karasmontana

Lithops kunjasensis

Lithops Julii

Lithops Lesliei



Lithops mickbergensis

Lithops optica



Lithops opalina



Lithops pseudotruncatella



Lithops rugosa



Lithops Ruschiorum

Lithops Schwantesii

Lithops vallis Mariae

nobilis (Haw.) Schwant. 2,50— 5
Roodiae (N. E. Br.)
Schwant. 4 —15
simulans (Marl.)
N. E. Br. 2

Psammophora
Dtr. et Schwant.

modesta (Dtr. et Brgr.)
Dtr. et Schwant. 3 — 6
Nissenii
Dtr. et Schwant. 3
longifolia L. Bol. . . 3 — 5

Psilocaulon N. E. Br.

Dinteri (Eng.) Schwant. 2
Gessertianum
Dtr. et Schwant. 1,50
puberulum Dtr. . . . 2

Rhinephyllum N. E. Br.

Muirii N. E. Br. . . . 3

Rimaria N. E. Br.

dubia N. E. Br. . . . 4 — 6
Heathii N. E. Br. . . . 4 — 8

Rhombophyllum
Schwant.

dolabriforme (L.)
Schwant. 2,50
rhomboideum (Salm)
Schwant. 2 — 6

Rhopalocalus
Dtr. et Schwant.

Weigangianus
Dtr. et Schwant. 2,50

Ruschia Schwant.

acutangula (Haw.)
Schwant. 1,50
aristulata (Sond.)
Schwant. 1,50
buchubergensis Dtr. . 2
Axthelmiana (Dtr.)
Schwant. 1,50
congesta (Salm) L. Bol. 1,50
dolomitica
Dtr. et Schwant. 3 —10
festiva (N. E. Br.)
Schwant. 1,50
filamentosa (L.) L. Bol. 1,50
Herrei Schwant. . . . 1,50—10
multiflora (Haw.)
Schwant. 1,50
perfoliata (Mill.)
Schwant. 1
pusilla Schwant. . . . 2
pygmaea (Haw.)
Schwant. 3 —10
rigida (Haw.) Schwant. 2
rubricaulis (Haw.)
L. Bol. 2,50— 5
rupicola (Engl.)
Schwant. 1,50
Ruschiana
Dtr. et Schwant. 2 — 5
sabulicola Dtr. 2
semidentata (Salm)
Schwant. 1,50
Steingroeveri (Pax.)
Schwant. 1,50
tumidula (Haw.)
Schwant. 1 — 3
umbellata (L.) Schwant. 1,50
umbelliflora (Jacq.)
Schwant. 1,50
uncinata (Mill.) Schwant. 2
unidens (Haw.) Schwant. 2
vulvaria (Dtr.) Schwant. 2

Schwantesia Dtr.

Ruedebuschii Dtr. . . 2,50
succumbens Dtr. . . 2

Sceletium N. E. Br.

strictum L. Bol. . . . 5
tortuosum (L.)
N. E. Br. 4 — 8

Semnanthe N. E. Br.

lacera (Haw.) N. E. Br. 1,50

Stomatium Schwant.

agninum (Haw.)
Schwant. 3 —10
ermininum Schwant. . 4

Titanopsis Schwant.

calcarea (Marl.)
Schwant. 1,50
Schwantesii (Dtr.)
Schwant. 3

Trichocyclus N. E. Br.

ciliatus (Ait.) N. E. Br.
(Schenckii Schz.) 2,50

Trichodiadema
Schwant.

barbatum (L.) Schwant. 1 — 4
bulbosum (Haw.)
Schwant. 1 — 4
densum (Haw.)
Schwant. 2 — 5
intonsum (Haw.)
Schwant. 1,50
setuliferum (N. E. Br.)
Schwant. 1,50
stellatum (Mill.)
Schwant. 3 — 5
stelligerum (Haw.)
Schwant. 1.50
tuberosum (L.) Schwant. 1,50



Lithops summitatum

Lithops urikosensis



Titanopsis Schwantesii

Ruschia Herrei

Liebhaber-Sortimente.

12	Sukkulenten	von RM 8 an
25	Sukkulenten	von RM 20 an
50	Sukkulenten	von RM 50 an
100	Sukkulenten	von RM 150 an
6	Mesembrianthemen, strauchige und stengellose (Mimikry) Arten	von RM 8 an
12	Mesembrianthemen, strauchige und stengellose (Mimikry) Arten	von RM 15 an
25	Mesembrianthemen, strauchige und stengellose (Mimikry) Arten	von RM 40 an
6	Mesembrianthemen, nur stengellose Arten (Lithops, Conophytum usw.)	von RM 10 an
12	Mesembrianthemen, nur stengellose Arten (Lithops, Conophytum usw.)	von RM 20 an
25	Mesembrianthemen, nur stengellose Arten (Lithops, Conophytum usw.)	von RM 60 an

Kultur-Erde

für Sukkulenten Mesembrianthemen

gesiebt, in vorzüglicher Beschaffenheit

5 kg	1,20
25 kg	4,00
50 kg	6,00
100 kg	10,00

Purpusol

best bewährtes Vertilgungsmittel für alle Sukkulenten-Schädlinge

1 Flasche 2 RM.

Unentbehrlich für Liebhaber:

„Die Kakteen und ihre Kultur“

in deutscher und schwedischer Sprache von F. Fobe.
Herausgegeben und ergänzt von R. Graessner.

Die neue Auflage ist um eine Abhandlung über die Kultur der Mesembrianthemen einschl. der „Lebenden Steinchen“ erweitert. Das Büchlein enthält auch einen Abschnitt über die Heranzucht von Kakteen aus Samen

Preis 1.00 Mark — Porto 15 Pfennig.

Versand nur gegen Voreinsendung.

Verlag von R. Graessner, Perleberg.

Empfehlenswerte Literatur:

von mir zu Originalpreisen lieferbar.

Crassulaceae. Von A. Berger. (Allgemeiner Teil von A. Berger und H. Harms.) Für den Liebhaber der Gattungen Crassula, Cotyledon, Echeveria, Sedum, Sempervivum, Aeonium u. a. unentbehrlich. Preis RM. 18,—.

Sukkulentenforschungen in Südwestafrika. Von Professor Dinter.

I. Teil Preis RM. 6,—; II. Teil Preis RM. 5,50.

Der erste Teil bringt in interessanter Art den Bericht mit den Ergebnissen der Forschungsreise Prof. Dinters im Jahre 1922 und der zweite die Erlebnisse und Ergebnisse in Südwestafrika vom Jahre 1923 bis 1925.

Sukkulente Euphorbien. Beschreibung und Anleitung zum Bestimmen der kultivierten Arten mit kurzen Angaben über die Kultur. Von Alwin Berger. Mit 33 Abbildungen. Preis gebunden RM. 4,—.

Mesembrianthemen und Portulacaceen. Beschreibung und Anleitung zum Bestimmen der wichtigsten Arten mit kurzen Angaben über die Kultur. Von Alwin Berger. Mit 67 in den Text gedruckten Abbildungen. Preis geb. RM. 8,—.

Stapelien und Kleinien. Beschreibung und Anleitung zum Bestimmen der wichtigsten Arten mit kurzen Angaben über die Kultur. Von Alwin Berger. Mit 79 Abbildungen. Preis gebunden RM. 10,—.

Die Agaven. Beschreibung und Anleitung zum Bestimmen der verschiedenen Arten mit kurzen Angaben über die Kultur. Von Alwin Berger. Mit 79 Abbildungen und 2 Verbreitungskarten. Preis RM. 9,—.

Sukkulenten. Von Dr. W. von Roeder.

Ein Führer durch das gesamte Reich der Fettpflanzen. Mit 35 Kunstdrucktafeln. In Leinen gebunden RM. 8,—, kartoniert RM. 5,80.

Praktischer Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und anderer Sukkulenten. Von W. O. Rother.

Neu bearbeitet von W. Vorwerk, Gartendirektor am Bot. Garten in Berlin-Dahlem. Gebunden RM. 5,50.

Der Kakteen- u. Sukkulenten-Zimmergarten in Idealismus u. Praxis. Von Karl Hirscht. Mit 36 Abbildungen. Dritte, wesentlich erweiterte Auflage. Preis RM. 3,—.

1129645
6490

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)